

**ÉVALUATION COMMUNE**  
**CORRECTION Yohan Atlan © [www.vecteurbac.fr](http://www.vecteurbac.fr)**

**CLASSE :** Terminale

**E3C :**  E3C1  E3C2  E3C3

**VOIE :**  Générale

**ENSEIGNEMENT :** Enseignement scientifique

**DURÉE DE L'ÉPREUVE :** 1 h

**CALCULATRICE AUTORISÉE :**  Oui  Non

## Le protoxyde d'azote et le réchauffement climatique

*Sur 10 points*

*Thème « Science, climat et société »*

**1-**

1a) 2. l'infrarouge

1b) 3. absorbe une partie du rayonnement infrarouge


1c) 3. la vapeur d'eau (H<sub>2</sub>O) et 1. le dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>)

1d) 2. 1°C

**2-**

Le spectre d'absorption infrarouge du protoxyde d'azote (N<sub>2</sub>O) montre plusieurs bandes d'absorption, ce qui indique que ce gaz absorbe les radiations infrarouges émises par la Terre dans la gamme de longueurs d'onde de 7 à 15 µm. Cela signifie que le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre qui retient la chaleur dans l'atmosphère.

### **Document 1 : spectre d'absorption infrarouge du protoxyde d'azote (N<sub>2</sub>O)**




*D'après la base de données du National Institute of Standard and Technologie (USA)*

**3-**

**3a)**

Les émissions totales de N<sub>2</sub>O anthropiques en 2005 est de 6,9 TgN



$6,9 \text{ TgN} = 6,9 \times 10^{12} \text{ g d'azote}$   
 $6,9 \text{ TgN} = 6,9 \times 10^6 \times 10^6 \text{ g d'azote}$   
 $6,9 \text{ TgN} = 6,9 \times 10^6 \text{ tonnes d'azote}$

### 3b)

Le pourcentage des émissions de  $\text{N}_2\text{O}$  anthropiques par rapport aux émissions totales pour 2005 est :

$$\text{Pourcentage des émissions de } \text{N}_2\text{O} \text{ anthropiques} = \frac{\text{émissions de } \text{N}_2\text{O} \text{ anthropiques}}{\text{émissions de } \text{N}_2\text{O} \text{ totales}} \times 100$$

$$\text{Pourcentage des émissions de } \text{N}_2\text{O} \text{ anthropiques} = \frac{6,9 \times 10^6}{14,5 \times 10^6} \times 100$$

$$\text{Pourcentage des émissions de } \text{N}_2\text{O} \text{ anthropiques} = 47,6\%$$

### 4-

L'agriculture est la principale source d'émissions de protoxyde d'azote d'origine anthropique, contribuant à 47,6 % des émissions totales de  $\text{N}_2\text{O}$ .

Les principales activités agricoles responsables de ces émissions sont la fertilisation azotée des cultures, l'élevage et la gestion des déchets animaux, ainsi que la gestion des sols. La production de viande est une source importante de ces émissions car elle nécessite une grande quantité d'engrais pour la culture de céréales destinées à l'alimentation animale, ainsi que la gestion des déjections animales.

Le document 3 montre une augmentation de la production mondiale de viande de 1961 à 2009.

Le document 4 montre une augmentation de la concentration atmosphérique en  $\text{N}_2\text{O}$  de 1750 à 2010.

L'utilisation excessive d'engrais azotés dans l'agriculture peut également entraîner la pollution des eaux souterraines et de surface. En outre, les émissions de  $\text{N}_2\text{O}$  contribuent de manière significative au réchauffement climatique, car le  $\text{N}_2\text{O}$  est un gaz à effet de serre potentiellement 300 fois plus puissant que le dioxyde de carbone.

Par conséquent, la réduction des émissions de  $\text{N}_2\text{O}$  provenant de l'agriculture est cruciale pour atténuer le changement climatique et préserver l'environnement pour les générations futures.