



## Exercice 1 – Niveau première

Thème « Une longue histoire de la matière »


### La formation des verres

Sur 10 points

La silice est la forme naturelle du dioxyde de silicium ( $\text{SiO}_2$ ) qui entre dans la composition de nombreux minéraux (quartz, etc.) et de nombreuses roches (sable, grès, granite, etc.). Le verre désigne un solide non cristallin (amorphe). Sa composition chimique contient une part importante de silice.

### Partie 1 – La silice : une structure amorphe ou cristalline


#### Document 1 – Modèles moléculaires de deux structures en coupe de la silice



Source : d'après CHAGUETMI, Salem (2010), *Élaboration et caractérisation de nouveaux verres de fluorohafnates de strontium et de phosphosulfates*. Université Mohamed Khider Biskra

- 1- La figure du document 1 montre deux structures possibles de la silice. L'une est dite cristalline, l'autre amorphe (verre). Parmi les représentations a et b, préciser laquelle correspond à une structure cristalline. Justifier votre choix.






## Partie 2 – Formation du verre en contexte géologique


Les basaltes et les gabbros sont des roches magmatiques qui se forment dans plusieurs contextes géologiques, notamment au niveau des dorsales océaniques.

### Document 3 – Structures du basalte et du gabbro



Basalte de dorsale océanique

Pyroxène  
Olivine  
Plagioclase  
verre



Gabbro de la croûte océanique

Photographies de lames minces de roches observées au microscope en lumière polarisée et analysée (grossissement x40).

Source : <http://www.ipgp.fr/fr> Catherine Mével

Source : Banque Nationale de photo en SVT-Lyon [www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/photossq/photos.php](http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/biologie/photossq/photos.php)

- 5- Ranger par ordre d'échelle croissante les 5 termes suivants : roche, atome, cristal, maille, minéral. Quels termes mobiliser pour décrire les photographies du document 3 ?
- 6- Comparer la structure cristalline de ces deux échantillons de roches, puis, à partir des informations précédentes, proposer une explication des différences observées.

Modèle CCYC : ©DNE

Nom de famille (naissance) :

(Suivi s'il y a lieu, du nom d'usage)

Prénom(s) :

N° candidat :  N° d'inscription :

(Les numéros figurent sur la convocation.)

Né(e) le :  /  /



1.1

### Partie 3 – La datation des basaltes

La datation des basaltes peut faire appel à une méthode de datation radiochronologique appelé « méthode rubidium - strontium (Rb-Sr) ». Cette méthode

se base sur la mesure des rapports  $\frac{^{87}\text{Sr}}{^{86}\text{Sr}}$  et  $\frac{^{87}\text{Rb}}{^{86}\text{Sr}}$ .

- 7- Parmi les noyaux de  $^{87}_{37}\text{Rb}$ , de  $^{87}_{38}\text{Sr}$  et de  $^{86}_{38}\text{Sr}$ , seul le noyau de  $^{87}_{37}\text{Rb}$  est dit radioactif. Définir ce terme.
- 8- Définir le terme de « demi-vie » puis indiquer le nombre de noyau de  $^{87}_{37}\text{Rb}$  restants au bout de 3 demi-vies sur un échantillon initial de 1000 noyaux.